

Kapitel 12

Aufgabensammlung

12.5 Reelle Funktionen; Stetigkeit

5.4 Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $a, b \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie:

12/5/4/1

Ist f injektiv und stetig in $[a, b]$, dann ist f streng monoton in $[a, b]$.

Lösung zu Aufgabe 5.4 Aus der Injektivität von f in $[a, b]$ folgt $f(a) < f(b)$ oder $f(b) < f(a)$. 12/5/4/3

1. Fall: $f(a) < f(b)$. Wir zeigen, daß f streng monoton wächst.

Angenommen, f ist in $[a, b]$ nicht streng monoton wachsend, dann existieren $a_1, a_2 \in [a, b]$ mit $a_1 < a_2$ und $f(a_1) > f(a_2)$.

Wir nehmen eine erneute Fallunterscheidung vor:

(α) $f(b) < f(a_2)$. Wegen $f(a) < f(b)$ ist $f(a) < f(a_2) < f(a_1)$.

Nach dem Zwischenwertsatz gibt es ein $c \in (a, a_1)$, so daß $f(c) = f(a_2)$.

Das widerspricht der Injektivität von f .

(β) $f(a_2) < f(b)$; dann ist $f(a_1) < f(b)$ oder $f(b) < f(a_1)$ und schließlich

$$f(a_2) < f(a_1) < f(b) \quad \text{oder} \quad f(a_2) < f(b) < f(a_1).$$

Nach dem Zwischenwertsatz existiert ein $c \in (a_2, b)$, so daß $f(c) = f(a_1)$ oder es existiert ein $c \in (a_1, a_2)$, so daß $f(c) = f(b)$. In jedem Falle erhält man einen Widerspruch zur Injektivität von f . Folglich ist f streng monoton wachsend.

2. Fall: $f(b) < f(a)$. Hierfür zeigt man völlig analog wie im ersten Fall, daß f in $[a, b]$ streng monoton fällt.