

## Kapitel 12

### Aufgabensammlung

#### 12.6 Der n-dimensionale ... Raum ...

**6.15** Es sei  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ . Zeigen Sie, daß  $A$  genau dann kompakt ist, wenn jede unendliche Teilmenge von  $A$  einen Häufungspunkt in  $A$  besitzt. 12/6/15/1

**Lösung zu Aufgabe 6.15** Für endliche Mengen ist die Behauptung trivial. Es sei  $A$  unendlich. 12/6/15/3

( $\longrightarrow$ ) Sei  $A$  kompakt, also beschränkt und abgeschlossen und  $U$  eine unendliche Teilmenge von  $A$ . Nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß (6/1/24) besitzt  $U$  einen Häufungspunkt.

( $\longleftarrow$ ) Angenommen,  $A$  ist nicht beschränkt, d.h., für jedes  $c \in \mathbb{R}$  gibt es ein  $a \in A$  mit  $|a| > c$ . Dann läßt sich (induktiv) eine unendliche Teilmenge  $U := \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  von  $A$  definieren, die keinen Häufungspunkt besitzt.

Sei  $a_0 \in A$  beliebig. Nach Voraussetzung existieren  $a_1 \in A$  mit  $|a_1| > |a_0| + 1$ ,  $a_2 \in A$  mit  $|a_2| > |a_1| + 1, \dots$ . Dies widerspricht der Voraussetzung. Folglich ist  $A$  beschränkt. Es bleibt noch die Abgeschlossenheit von  $A$  nachzuweisen.

Angenommen,  $A$  ist nicht abgeschlossen. Dann besitzt  $A$  einen Häufungspunkt  $\bar{a}$ , der nicht zu  $A$  gehört. Damit existiert eine Folge  $(\bar{x}_i)$  in  $A$  mit  $\bar{x}_i \rightarrow \bar{a}$ . Wegen  $\bar{x}_i \in A$  ist  $\bar{x}_i \neq \bar{a}$  und somit  $U := \{\bar{x}_i : i \in \mathbb{N}\}$  eine unendliche Teilmenge von  $A$ .  $U$  besitzt nach Voraussetzung einen Häufungspunkt  $\bar{b} \in U$ . Dann gibt es eine Teilfolge  $(\bar{x}_{i_j})$  von  $(\bar{x}_i)$ , die gegen  $\bar{b}$  konvergiert. Folglich gilt:  $\bar{x}_{i_j} \rightarrow \bar{b}$  und  $\bar{x}_{i_j} \rightarrow \bar{a}$ , also  $\bar{b} = \bar{a}$  und somit  $\bar{a} \in U \subseteq A$ ,  $\mathcal{M}$ !