

## Kapitel 12 Aufgabensammlung

### 12.7 Differentialrechnung (1 Veränderliche)

7.9 Bilden Sie die Ableitung folgender Funktionen:

12/7/9/1

$$(a) f(x) = \begin{cases} 1, & \text{für } x \leq 0, \\ x^4 + 1, & \text{für } x > 0. \end{cases} \quad (b) f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{für } x < 0, \\ e^x, & \text{für } x \geq 0. \end{cases}$$

Lösungshinweis zu Aufgabe 7.9 (a)  $f'(x) = \begin{cases} 4x^3 & \text{für } x < 0, \\ 0 & \text{für } x \geq 0. \end{cases}$

12/7/9/2

$$(b) f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x < 0, \\ e^x & \text{für } x > 0. \end{cases}$$

Lösung zu Aufgabe 7.9

12/7/9/3

(a) Für  $x < 0$  ist  $f'(x) = 0$ ; für  $x > 0$  ist  $f'(x) = 4x^3$ .

Es sei nun  $a = 0$ . Wir bilden  $f'(a)$ .

Für  $x < 0$  ist  $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1 - 1}{x} = 0$  und

für  $x > 0$  ist  $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^4 + 1 - 1}{x} = x^3 \xrightarrow[x > 0]{x \rightarrow 0} 0$ .

Links- und rechtsseitiger Limes des Differenzenquotienten stimmen an der Stelle 0 überein und sind 0. Folglich ist  $f'(0) = 0$ .

(b) Für  $x < 0$  ist  $f'(x) = 1$ ; für  $x > 0$  ist  $f'(x) = e^x$ .

Es sei nun  $a = 0$ . Wir bilden  $f'(a)$ .

Für  $x < 0$  ist  $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x + 1 - e^0}{x} = 1$ .

Für  $x > 0$  ist  $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{e^x - e^0}{x} \xrightarrow[x > 0]{x \rightarrow 0} 1$ .

(Hierbei wird ausgenutzt, daß  $(e^x)' = e^x$ , insbesondere an der Stelle 0.)

Folglich ist  $f'(0) = 1$ .