

## Kapitel 12 Aufgabensammlung

### 12.7 Differentialrechnung (1 Veränderliche)

**7.19** Berechnen Sie mit Hilfe des Taylorschen Satzes:

12/7/19/1

- (a)  $\cos \frac{1}{10}$ , so daß der Fehler  $\leq 10^{-6}$  wird,
- (b)  $\ln 2$ , so daß der Fehler  $\leq 10^{-1}$  wird,
- (c)  $e^{\frac{1}{100}}$ , so daß der Fehler  $\leq 10^{-6}$  wird.

[Hinweis: Man betrachte bei Aufgabe (b) die Funktion  $\ln(1+x)$ .]

**Lösungshinweis zu Aufgabe 7.19** Es sei  $R_n(x)$  das Restglied in der Taylorschen Formel. Dann gilt für die entsprechenden Funktionen in (a) - (c):

12/7/19/2

- (a)  $|R_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}}$ ; somit leistet  $n = 4$  das Verlangte.
- (b)  $|R_n(x)| \leq \frac{1}{n+1}$ ;  $n = 9$  leistet das Verlangte.
- (c)  $|R_n(\frac{1}{100})| \leq \frac{4}{(n+1)! \cdot 10^{2n+2}}$ ;  $n = 2$  leistet das Verlangte.

**Lösung zu Aufgabe 7.19** Nach dem Taylorsche Satz (vgl. 7/2/9) gilt:

12/7/19/3

$$f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!} \cdot (x-a)^i + R_n(x),$$

wobei  $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(a + \vartheta(x-a))}{(n+1)!} \cdot (x-a)^{n+1}$  und  $0 < \vartheta < 1$ .

- (a) Für  $f(x) = \cos x$  ist  
 $f'(x) = -\sin x$ ,  $f''(x) = -\cos x$ ,  $f'''(x) = \sin x$ ,  $f^{(4)}(x) = \cos x$  und  
 $f^{(4n+i)}(x) = f^{(i)}(x)$ .

Wir setzen  $a = 0$ , dann ist

$$f(a) = 1, f'(a) = 0, f''(a) = -1, f'''(a) = 0, f^{(4)}(a) = 1, f^{(4n+i)}(a) = f^{(i)}(a).$$

Offenbar ist stets  $|f^{(n)}(x)| \leq 1$ ; somit gilt für  $x = \frac{1}{10}$

$$|R_n(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(a + \vartheta(x-a))|}{(n+1)!} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^{n+1} \leq \frac{1}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}}.$$

Schließlich gilt für  $n = 4$

$$|R_n(\frac{1}{10})| \leq \frac{1}{5! \cdot 10^5} < 10^{-6}. \text{ Also}$$

$$\cos \frac{1}{10} \approx \sum_{i=0}^4 \frac{f^{(i)}(0)}{i!} \cdot 1^i = 1 - \frac{1}{2! \cdot 10^2} + \frac{1}{4! \cdot 10^4}.$$

(b) Sei  $f(x) = \ln(1+x)$ . Induktiv über  $n \geq 1$  zeigt man leicht:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \cdot \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}.$$

Für  $a = 0$  und  $x = 1$  ist

$$|R_n(x)| = \frac{1}{(n+1)!} \cdot |(-1)^n| \cdot \frac{n!}{(1+\vartheta)^{n+1}} \cdot 1^{n+1} = \frac{1}{(n+1) \cdot (1+\vartheta)^{n+1}} \leq \frac{1}{n+1}.$$

Wählt man  $n = 9$ , so ist  $|R_n(1)| \leq \frac{1}{10}$ . Folglich ist

$$\ln 2 \approx \sum_{i=0}^9 \frac{f^{(i)}}{i!} = \sum_{i=1}^9 \frac{(-1)^{i-1}}{i}.$$

(c) Sei  $f(x) = e^x$ . Dann ist  $f^{(n)}(x) = e^x$ . Für  $a = 0$  und  $x = \frac{1}{100}$  gilt:

$$|R_n(\frac{1}{100})| = \frac{e^{\frac{\vartheta}{100}}}{(n+1)!} \cdot \left(\frac{1}{100}\right)^{n+1} \leq \frac{4}{(n+1)! \cdot 10^{2n+2}}.$$

Wählt man  $n = 2$ , so ist  $|R_n(\frac{1}{100})| < 10^{-6}$ . Also

$$e^{\frac{1}{100}} \approx \sum_{i=0}^2 \frac{f^{(i)}(0)}{i!} \cdot \left(\frac{1}{100}\right)^i = 1 + \frac{1}{100} + \frac{1}{2 \cdot 100^2}.$$